

І.І. Полохіна¹, С.Д. Трискиба², М.М. Сухомлин³

АМАНІТАЛЬНІ ГРИБИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «СВЯТИ ГОРИ»

Національний природний парк «Святі Гори», аманітальні гриби

Вступ

Національний природний парк «Святі Гори» (НПП), створений у 1997 р. за Указом Президента України № 135/97, знаходиться у Слов'янському та Краснолиманському районах на півночі Донецької області. Його територія займає площу 40589 га, яка належить до Лівобережного злаково-лучного степу, одного із східних ботаніко-географічних районів України, Донецького лісостепового округу дубових лісів, лучних і різnotравно-злакових та петрофільних лісів [8].

Територія Національного парку досить повно відображає ландшафтну, біогеоценотичну і біологічну розмаїтість прирусової частини басейну ріки Сіверський Донець. Згідно з фізико-географічним районуванням України, територія розташована в степовій зоні на межі Донецько-Донської і Лівобережно-Дніпровської північно-степових провінцій, яка проходить по Сіверському Дінцю [12].

У різноманітних умовах рельєфу правобережжя ростуть широколистяні ліси віком 90 – 110 років з перевагою дуба звичайного (*Quercus robur L.*), які сформувалися завдяки підвищенню рельєфу Донецького кряжу і є досить рідкісним явищем на плакорах степової зони. На кількох ділянках збереглися старі дібриві віком 280 – 300 років, при цьому деякі екземпляри дуба сягають 400 – 600-літнього віку. Дібриви займають третину загальної площи НПП, серед них переважають насадження порослевого походження, але збереглися й ділянки з високостовбурними, висотою до 30 – 35 м, деревостанами насіннєвого походження.

Ліси, у яких домінує сосна звичайна (*Pinus sylvestris L.*), займають в НПП практично цілком першу надзаплавну терасу (борову), окремими фрагментами зустрічаються в заплаві і виходять місцями на другу лісову терасу. У залежності від ґрунтових умов у сосняках розвиваються підлісок і трав'янистий покрив. Майже всі соснові насадження штучні, і більшість з них ще відносно молоді, хоча вік деяких окремих дерев перевищує 100 років.

Особливу цінність мають унікальні крейдяні бори, сформовані сосною крейдяною (*Pinus sylvestris L. var. cretacea Kalenicz. ex Kom.*) – третинним реліктом, занесеним до Червоної книги України [11].

Широкий спектр екологічних умов від перезволожених лук і водойм заплави до ділянок ксерофільної степової рослинності на плакорах і крейдяних відслоненнях забезпечує багатство та розмаїтість рослинного світу.

Всі ці особливості визначають і широкий видовий спектр мікофлори природного парку.

Мікофлора різних фітоугруповань представляє інтерес у зв'язку з їхньою екологічною функцією в мікоризоутворюванні, процесах деструкції деревини та розкладання органічних решток.

Виходячи із вищезазначеного, вивчення мікобіоти Національного природного парку «Святі Гори» має важливе значення для розуміння та прогнозування процесів, що відбуваються у зв'язку зі збільшенням антропогенного навантаження, внаслідок якого трансформація мікокомпонента може привести до порушення біологічних циклів, зниження продуктивності та стійкості екосистем.

Мета та завдання

Метою нашої роботи було проведення інвентаризації аманітальних грибів НПП «Святі Гори» як частини загальної інвентаризації макроміцетів даної території, у зв'язку з чим нами були поставлені наступні завдання: виявлення видового складу та еколо-трофічного спектру грибів родини Amanitaceae Heim. (в тому числі, рідкісних), характеру їх поширення у природних та штучних екотопах.

Об'єкти та методи дослідження

Дослідження видового складу макроміцетів НПП «Святі Гори» нами проводяться з 1996 року в різні сезонні періоди [12, 17].

Польові обстеження території проводили за загальноприйнятими методиками маршрутно-експедиційним способом з урахуванням природно-кліматичних чинників регіону [1, 9]. У ході обстежень складали польові щоденники, діагностичні анкети, загальні переліки виявлених базидіоміцетів, збиралі гербарій, який проходив подальшу камеральну обробку [3]. Гербарні зразки були опрацьовані за методикою А.С. Бондарцева, Р.А. Зінгера [1]. Спорові відтиски зроблені за методикою Д. Сейвала [14]. Для виявлення видової належності деяких видів було використано методи біохімічних барвникових реакцій [15].

Ідентифікацію видів грибів проводили за визначниками грибів України, а також визначниками та монографіями вітчизняних та іноземних видань [2, 4, 6, 7, 14].

При наданні еколо-трофічних характеристик видів використовували такі градації показників та їх умовні позначення [10]: сапротрофи – Fd (на опаді), St (на підстилці), Hu (на гумусі), Le (на деревині), Lei (на розкладеній деревині), Lep (на нерозкладеній деревині), Lh (на коренях та підземній деревині), He (на залишках трав'янистих рослин), M (на моах), Mm (на плодових тілах макроміцетів), Ex (на екскрементах), C (на вугіллі); сімбіотрофи – Mr (мікоризоутворювачі); паразити – P (факультативні на деревах).

Результати досліджень та їх обговорення

В результаті наших досліджень в НПП «Святі Гори» було виявлено 22 види аманітальних макроміцетів із 4 родів та 2 родин. Наводимо їх конспект.

BASIDIOMYCETES

Agaricales Clem. (1909) – Агарікальні

Amanitaceae Heim. – Аманітові

Amanita Pres. (1797) – Мухомор

A. citrina (Schaeff.) Gray – м. цитриновий. Природні та штучні соснові сухі бори (кв. 152, 156), щорічно, масово в 2010. Поодиноко. Збір С.Д. Трискиба, І.І. Полохіна. Mr (мікоризний сімбіотроф сосни).

A. excelsa var. *spissa* (Fries) Neville et Poumarat – м. товстий. Мішані ліси, нагірні діброви (кв. 39, 40), 20.07.2008 . Поодиноко. Збір С.Д. Трискиба, І.І. Полохіна, М.М. Сухомлин. Mr (мікоризний сімбіотроф сосни).

A. gemmata (Fr.) Gillet – м. яскраво-жовтий. (– *A. junguilla*). Соснові угруповання прибережної частини крейдяних схилів та поблизу досить зволожених вільхових колок (кв. 39, 40), 20.07.2008. Поодиноко. Збір С.Д. Трискиба, І.І. Полохіна. Mr (мікоризний сімбіотроф сосни).

A. muscaria (L) Hook. – м. червоний. Природні та штучні соснові сухі бори (кв. 153, 22), щорічно. Поодиноко. Збір С.Д. Трискиба, І.І. Полохіна. Mr (мікоризний сімбіотроф сосни).

A. pantherina (DC.) Secr. – м. пантерний. Природні та штучні соснові сухі бори (кв. 22, 156), 13.08.2007. Поодиноко. Збір С.Д. Трискиба, І.І. Полохіна. Mr (мікоризний сімбіотроф сосни).

A. phalloides (Fr.) Secr. – м. зелений, бліда поганка. Мішані ліси, заплавні діброви, нагірні діброви, листяні ліси (дубово-кленові, дубово-липові) (кв. 152), 12.07.2009. Поодиноко. Збір С.Д. Трискиба, І.І. Полохіна. Mr (мікоризний сімбіотроф листяних дерев, переважно дуба, клена, ясеня).

A. porphyria (Fr.) Secr. – м. пурпурний. Природні та штучні соснові сухі бори (кв. 156, 22, 35), щорічно. Поодиноко. Збір С.Д. Трискиба, І.І. Полохіна. Mr (мікоризний сімбіотроф сосни).

A. rubescens (Fr.) Gray – м. сіро-рожевий. Природні та штучні соснові сухі бори (кв. 22, 35), 12.08.2007. Поодиноко. Збір С.Д. Трискиба, І.І. Полохіна. Mr (мікоризний сімбіотроф сосни).

A. virosa Lam. ex Secr. – м. вонючий. Мішані ліси, заплавні діброви, нагірні діброви, листяні ліси (дубово-кленові, дубово-липові) (кв. 152, 153), 11.07.2009. Поодиноко. Збір С.Д. Трискиба, І.І. Полохіна. Mr (мікоризний сімбіотроф листяних дерев, переважно дуба).

A. vittadinii (Mor.) Gilb. – м. Віттадіні. Лісостеп, поблизу лісу та лісосмуг. Лівобережна заплавна діброва (кв. 152), два екземпляри, дуже рідко. 13.10.2009, 14.06.2010. Поодиноко. Збір С.Д. Трискиба, І.І. Полохіна. (Один з небагатьох мухоморів, які плодоносять без утворювання мікоризи).

***Amanitopsis* Roze (1876) – Поплавок**

A. alba (Gill.) Fr. Syn – п. білий. Соснові ліси з березою на галявинах (кв. 22, 156), 25. 07.2007. Поодиноко. Збір С.Д. Тришкиба, І.І. Полохіна. Mr (мікоризний сімбіотроф сосни).

A. crocea (Quel.) Singer – п. шафрановий. Тільки в нагірних дібровах. (мішані ліси) (кв. 39, 40), 10.07.2008. Рідко, поодиноко. Збір В.А. Д'яков. Mr (мікоризний сімбіотроф сосни).

A. vaginata (Bull. Fr) Roze – п. сірий. Соснові ліси природного та штучного походження, іноді в мішаних лісах (кв. 22, 151), 25.07.2007. Поодиноко. Збір С.Д. Тришкиба, І.І. Полохіна. Mr (мікоризний сімбіотроф сосни).

Plutaceae Kotl. et Pouz. – Плютесеві

***Pluteus* Fr. (1836) – Плютей**

P. atricapillus (Batsch.) Fauod – п. бурий. На деревинних рештках та старих стовбурах листяних порід, природні та штучні насадження, байрачні ліси (кв. 151). Поодиноко. 28.07.2005. Збір С.Д. Тришкиба, І.І. Полохіна. Lep (ксилотроф).

P. atricapillus var. alba Peck – п. бурий різновидність біла. На деревних рештках та старих стовбурах листяних порід, природні та штучні насадження, байрачні ліси (кв. 151, 152), 19.06.2004. Поодиноко. Збір С.Д. Тришкиба, І.І. Полохіна. Lep (ксилотроф).

P. atromarginatus (Singer) Kuhn – п. чорнооторочений. На деревних залишках та старих стовбурах листяних порід, природні та штучні насадження, байрачні ліси (кв. 151), 07.06.2004. Поодиноко. Збір С.Д. Тришкиба, І.І. Полохіна. Lep (ксилотроф).

P. cervinus (Schaeff.) P. Kumm. – п. оліній. Малочисельний, поодиноко, хвойні та листяні ліси, на гнилій деревині (кв. 151, 152), 20.06.2001. Поодиноко. Збір С.Д. Тришкиба, І.І. Полохіна. Lei, Lep (ксилотроф).

P. salicinus (Fr.) P. Kumm. – п. вербовий. На старих та напівсухих стовбурах верби, вільхи, природні та штучні насадження (кв. 150, 151), 07.06.2004. Поодиноко. Збір С.Д. Тришкиба, І.І. Полохіна. Lep (ксилотроф).

P. umbrosus (Fr.) Kumm – п. умбрівий. На старих та напівсухих стовбурах верби, вільхи, природні та штучні насадження (кв. 151), 15.07.2002. Поодиноко. Збір С.Д. Тришкиба, І.І. Полохіна. Lep (ксилотроф).

***Volvariella* Speg. – Вольваріела шовковиста**

V. bombycina (Scyaeff. Fr) Sing – в. шелковистая. Поодинокі екземпляри на стовбурах живих та відмерлих дерев (тополі) (кв. 152), 18.06.1999. Поодиноко. Збір С.Д. Тришкиба, І.І. Полохіна. Lep (ксилотроф).

V. volvacea (Bull. Fr) Sing – в. вольвова. Поодинокі екземпляри на стовбурах живих та відмерлих дерев (тополі) (кв. 152), 28.08.2000. Поодиноко. Збір С.Д. Тришкиба, І.І. Полохіна. Lep (ксилотроф).

Таксономічний розподіл аманітальних базидіоміцетів НПП «Святі Гори» наведено в таблиці.

В мікобіотах НПП «Святі Гори» більша частина аманітальних грибів належить до мікоризоутворювачів (Mr) – це роди *Amanita* і *Amanitopsis* (14 видів), за виключенням *Amanita vittadinii*, еколо-трофічна належність якого не є безумовною.

До ксилотрофів (Le) належать роди *Pluteus* і *Volvariella* (8 видів).

З вищепереліченого списку грибів слід виділити два види – *Amanitopsis crocea* та *Amanita vittadinii* (рис.).

Таблиця. Кількісний таксономічний розподіл видів аманітальних грибів НПП «Святі Гори»

Родина	Рід	Кількість видів
<i>Amanitaceae</i>	<i>Amanita</i>	11
	<i>Amanitopsis</i>	3
<i>Plutaceae</i>	<i>Pluteus</i>	6
	<i>Volvariella</i>	2
Всього родин – 2	Всього родів – 4	Всього видів – 22




Рис. Мухомор Віттадіні –
Amanita vittadinii (Mor.) Gilb.

Amanitopsis crocea за увесь період досліджень був знайдений тільки один раз на крейдяних схилах правого берега Сіверського Дніця.Хоча цей вид не є рідкісним для України, на території НПП «Святі Гори» він практично не зустрічається, незважаючи на характерні сприятливі екологічно-кліматичні умови.

Amanita vittadinii є також дуже рідкісним для даної території. В літературі знахідки цього гриба були пов’язані з степовими фітоценозами [4], в НПП *A. vittadinii* був знайдений в заплавній лівобережній дібрі. Цей вид занесений до Червоної книги Росії [11], та деяких країн Європи, тому, як і його близькоспорідненній вид *A. solitaria* може бути рекомендований для занесення до Червоних книг Донецької області та України [13].

Висновки

Таким чином, аманітальні макроміцети нами виявлені у листяних, мішаних та хвойних фітоугрупованнях штучного та природного походження НПП «Святі Гори» і є важливою частиною мікобіоти біоценозів.

Виявлені види грибів цієї таксономічної групи відносяться переважно до мікоризних симбіотрофів та ксилотрофів, які належать до 22 видів, 4 родів, 2 родин.

Серед аманітальних макроміцетів НПП «Святі Гори» нами виявлений рідкісний для даного регіону вид – *Amanita vittadinii* (Mor.) Gilb., який потребує статусної охорони.

1. Бондарцев А.С. Руководство по сбору высших базидиальных грибов для научного изучения / А.С. Бондарцев, Р.А. Зингер // Тр. БИН АН СССР. – 1950 – М. ; Л. – Сер. 2, вып. 6. – С. 479–543.
2. Определитель грибов России. Порядок Афиллофоровые [М.А. Бондарцева]. – СПб. : Наука, 1998. – Вып. 2. – 390 с.
3. Васильева Л.Н. Изучение макроскопических грибов (макромицетов) как компонентов растительных сообществ / Л.Н. Васильева // Полевая геоботаника. – М. ; Л. : изд-во АН СССР, 1959. – С. 387–398.
4. Вассер С.П. Высшие базидиомицеты степной зоны Украины / С.П. Вассер, И.М. Солдатова – Киев.: Наук. думка, 1977. – 356 с.
5. Визначник грибів України / [відп. ред. Зеров Д. К., Пересипкін В.Ф.] – К. : Наук. думка, 1972. – 240, 5 (1) с.
6. Визначник грибів України / [відп. ред. Зеров Д. К., Пересипкін В.Ф.] – К. : Наук. думка, 1979. – 566, 5 (2) с.
7. Грюнерт Г. Грибы / Г. Грюнерт, Р. М. Грюнерт. – Астрель, 2002. – 288с.
8. Дідух Я.П. Геоботанічне районування України та суміжних територій / Я.П. Дідух, Ю.Т. Шеляг-Сосонко. – Укр. ботан. журн. – 2003. – Т. 60, № 1. – С. 6–18.
9. Дудка И.А. Грибы. Справочник миколога и грибника / И.А. Дудка, С.П. Вассер – Киев. : Наук. думка, 1987. – 536 с.

10. Коваленко А.Е. Экологический обзор грибов из порядков Polyporales s. str., Boletales, Agaricales s. str., Russulales в горных лесах центральной части Северо-Западного Кавказа // Микология и фитопатология. – 1980. – Т. 14, вып. 4. – С. 300–314.
11. Красная книга СССР. – М. : Лесн. пром-сть. – 1984. – 460 с.
12. Сухомлин М.Н. Макромицеты национального природного парка «Святые горы» / Сухомлин М.Н., Трискиба С.Д., Полохина И.И. // Сборник научных работ Луганского НАУ. – Луганск, 2002. – С. 48–51.
13. Червона книга України. Рослинний світ / Відп. ред. Шеляг-Сосонко Ю.Р. – К. : УЕ, 1996. – 608 с.
14. Ainsworth & Bisby's dictionary of fungi / P.M. Kirk, P.F. Cannon, J.C. David, J.A. Stalpers, Ed. 9. – Oxon; Wallingford : CAB International, 2001. – 655 p.
15. Moser M. Keys to agarics and bolets. English translation by S. Plant. / M. Moser. – London : SWI, 1983. – 493 p.
16. Savile D.B.O. Collection and care of botanical specimens / D.B.O. Savile // Can. Dept. Agaric. Publ. – 1962. – № 1113. – Р. 179–186.
17. Sukhomlyn M.M. Diversity of basidiomycota in the «Svyaty Gory» national nature park / M.M. Sukhomlyn, S.D. Triskiba // XIV Congress of European Mycologists. – 2003. – Р. 91.

¹Донецький інститут соціальної освіти

²КП «Регіональний центр поводження з відходами» при Донецькій обласній адміністрації

³НІС «Інституту біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Надійшла 27.05.2011

УДК 582.288:712.23 (477.62)

АМАНІТАЛЬНІ ГРИБИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «СВЯТИ ГОРИ»

І.І. Полохіна¹, С.Д. Тріскиба², М.М. Сухомлин³

¹Донецький інститут соціальної освіти

²КП «Регіональний центр поводження з відходами» при Донецькій обласній адміністрації

³НІС «Інституту біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Особливості ландшафтів НПП «Святі Гори» пов'язані з наявністю різноманітних за мікрокліматичними умовами ділянок, що обумовлює загальну різноманітність рослинності. Ці ж особливості обумовлюють різноманітність мікрофлори парку. Всього виділено 22 види аманітальних макроміцетів з 4 родин.

UDC 582.288:712.23 (477.62)

AMANITALES MACROMYCETES OF THE SVYATI GORY NATIONAL NATURE PARK

I.I. Polokhina¹, C.D. Triskiba², M.N. Sukhomlyn³

¹Donetsk Institute of Social Education

²Communal Enterprise «Regional Center of Waste Management» at Donetsk Regional Administration

³Educational and Scientific Center of «The Institute of Biology» of Kyiv National Taras Shevchenko University

The landscape peculiarities of the Svyati Gory National Nature Park are caused by the presence of areas with different microclimatic conditions which leads to general vegetation diversity. The same characteristics determine the diversity of micoflora in the park. On the whole 22 species of amanitales of 4 families have been found.